



# ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! КОРИЧНЕВО-МРАМОРНЫЙ КЛОП!

**Выход клопа из мест зимовки** и начало активного питания наблюдается при среднесуточной температуре +15 °C

Осматривайте любимые кормовые растения клопа – лавровишину, шелковицу, розоцветные, фундук.  
**Применяйте феромонные ловушки** для обнаружения вредителя:

- в садах и на полях – 1 шт/га,
- в частном секторе – 1 шт/участок,
- в теплицах -1 шт/ 1000 м<sup>2</sup>.

Для отлова и уничтожения вредителя:

- в садах и на полях – 13 шт/га, обработка инсектицидами вокруг места установки ловушки.



**Спаривание и откладка яиц** через 10-14 дней после выхода клопов с зимовки

Осматривайте листья растений с нижней стороны, на которой располагаются кладки яиц. Яйца белые шаровидные, кучками 20-30 штук.

При обнаружении яйцекладки механически уничтожаются.

**Этот метод позволит уничтожить будущее потомство в количестве до 300 экз. от одного клопа.**



**Отрождение личинок** через 5-7 дней после откладки яиц

Личинки имеют пять возрастов:

- в первой стадии личинки оранжево-черные;
- во второй стадии – черные;
- в следующих стадиях – серо-коричневые, с белыми пятнами на ногах и усиках, быстро бегают.

Обработку **рекомендованными препаратами** проводить в **утренние и вечерние часы**, соблюдая **регламенты применения инсектицидов и меры безопасности**.

При высокой численности провести повторную обработку через 14 дней.



**Уход клопа на зимовку**

Начиная со второй декады сентября и до весны проводите **регулярный осмотр** укрытий, сбор и уничтожение имаго клопа.

Устройте клопам **фальшивники** – развесьте на участке на высоте 2-3 метра картонные коробки, наполненные мятным гофрированным картоном. Коробки потом необходимо сжечь.



## РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 8(495)661-09-91 (Москва), 8(861)22454-07 (Краснодар)